



ANAFILAXIA

Fatores de Risco

FATORES RELACIONADOS COM A IDADE				
Crianças Incapazes de descrever os sintomas	Adolescentes e adultos jovens Comportamentos de risco	Gravidez e Parto Alergia a medicamentos Ex: antibiótico p/ prevenir infecção	Idosos Risco de óbito com reações a antibióticos e picada de inseto	
DOENÇAS CONCOMITANTES				
Asma <small>Outras doenças respiratórias</small>	Doenças cardíacas	Mastocitose	Dermatite atópica e Rinite alérgica	Doenças psiquiátricas
MEDICAMENTOS, BEBIDAS ALCOÓLICAS E DROGAS [maconha, cocaína, crack, etc.]				
Beta bloqueadores Inibidores da ECA	Alcool, sedativos, hipnóticos, antidepressivos e drogas (afeta o reconhecimento dos sintomas e dos agentes desencadeantes)			
FATORES QUE AMPLIFICAM A ANAFILAXIA				
Exercício	Infecções	Stress	Sair da rotina <small>(exemplo: viagens)</small>	Estado pré-menstrual
<ul style="list-style-type: none"> • Idade, doenças concomitantes e medicamentos contribuem para anafilaxia mais grave e até fatal • Alergias são fatores de risco para anafilaxia desencadeada por alimentos, exercícios e látex mas não apresentam risco elevado para anafilaxia por picada de insetos e meios de contraste • ECA = enzima conversora da angiotensina 				

Adaptado de Simons et al. Journal of Allergy & Clinical Immunology Março 2011